

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

# ウチダの漢方製剤

## ウチダの 麻黄湯

マオウトウ

ウチダの麻黄湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎劑で、特異な芳香があります。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は服用しないこと

(1) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

\* (2) 生後3ヵ月未満の乳児。

\* 2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 胃腸の弱い人。

\* (4) 発汗傾向の著しい人。

(5) 高齢者。

(6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

\* (7) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

\* (8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

## 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

\* (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

## 用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加えあまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ袋をとり出し2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。

## 用法・用量に関連する注意

\* 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

## 成分・分量

本品1袋中	
マ オ ウ	5.0g
キ ヨ ウ ニ ン	5.0g
ケ イ ヒ	4.0g
カ ン ゾ ウ	1.5g

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

## 効能・効果

頭痛、発熱、悪寒し汗は出ず身体疼痛、関節痛があるもの、あるいは咳や鼻血などを伴うもの。

感冒、気管支喘息、<sup>ぜんそく</sup>関節リウマチ、乳児鼻づまり

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8