

第2類医薬品

漢方製剤 **麻黄湯エキス[顆粒]A**

麻黄湯エキス[顆粒]Aは、漢方の古典「傷寒論」に記載されている漢方剤の「麻黄湯」から抽出したエキスを満量*配合した漢方処方です。

*満量処方とは：漢方処方より得られたエキスを全量(1日最大量)配合していることを意味します。

~~~~~ このような方に ~~~~~

- かぜのひきはじめて寒気や発熱がある方
- せきがでて体の節々の痛い感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (2) 生後3か月未満の乳児。

2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸の弱い人。
  - (4) 発汗傾向の著しい人。
  - (5) 高齢者。
  - (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |
| そ の 他 | 発汗過多、全身脱力感     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、<br>筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1ヵ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなりな  
ない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談し  
てください

## 【効能又は効果】

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体の  
ふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

## 【用法及び用量】

食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

食間とは…食後2~3時間を指します。

| 年 齢         | 1回量   | 1日服用回数 |
|-------------|-------|--------|
| 成人(15歳以上)   | 1 包   | 3回     |
| 15歳未満 7 歳以上 | 2/3 包 |        |
| 7 歳未満 4 歳以上 | 1/2 包 |        |
| 4 歳未満 2 歳以上 | 1/3 包 |        |
| 2 歳未満       | 1/4 包 |        |

## 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場  
合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】

本品3包(5.1g)中、下記の生薬より抽出した麻黄湯エキス1.92gを含有します。

日局マオウ ……………5.0g 日局キョウニン ……………5.0g  
日局ケイヒ ……………4.0g 日局カンソウ ……………1.5g

添加物として乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、  
軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、D-マンニトールを含みます。

## 【成分に関連する注意】

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して  
ください。



本品についてのお問い合わせは、下記までお願いします。

御所薬舗株式会社 お客様相談室

住 所：〒639-2200 奈良県御所市1207番地

電 話：0745(62)3388

受付時間：午前9:00から午後5:00まで(土・日・祝日を除く)

製造販売元

**御所薬舗株式会社**

奈良県御所市1207番地