

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

せき、ぜんそく、気管支炎に
まきょうかんせきとう
DHC 漢方 麻杏甘石湯エキス錠

<一般用漢方製剤>

第2類医薬品

DHC漢方麻杏甘石湯エキス錠は、中国の古典医学書「傷寒論」^{しょうかんろん}に記載されている麻杏甘石湯のエキスを服用しやすい錠剤にした漢方薬です。せき込んだり、気管支が弱くゼーゼー、ヒューヒュー聞こえて息苦しいときに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|----------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渴くものの次の諸症：
せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み

■ 用法・用量

次の量を食間に水又は白湯にて服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-----------|---------|------|
| 成人(15才以上) | 6錠 | 1日3回 |
| 7才以上15才未満 | 4錠 | |
| 5才以上7才未満 | 3錠 | |
| 5才未満 | 服用しないこと | |

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

18錠(成人1日量)中

下記の成分及び分量からなる麻杏甘石湯水製エキス700mgを含有します。

| 成分 | 分量 |
|-------|------|
| マオウ | 2.0g |
| キョウニン | 2.0g |
| カンゾウ | 1.0g |
| セッコウ | 5.0g |

添加物として、カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有します。

【成分に関連する注意】

本剤は生薬を用いていますので、錠剤の色調が異なることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。
6. 本剤にぬれた手で触れないでください。また、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので注意してください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029

受付時間 9:00~17:00(日・祝日ものをぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp