

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

麻杏甘石湯

漢方製剤

麻杏甘石湯エキス顆粒「トーア」

麻杏甘石湯(マキヨウカンセキトウ)は、漢方の古典「傷寒論」に収載されているせき、ぜんそくの代表処方です。

本処方は麻黄(マオウ)、杏仁(キヨウニン)、甘草(カンゾウ)、石膏(セッコウ)からなり、麻黄はせきを鎮め、杏仁は痰をとり、石膏は熱をさします。麻黄、杏仁、石膏が協力して、熱を冷まし、血行を盛んにしてのどのとおりをよくしてせきをしづめます。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4)胃腸の弱い人。
- (5)発汗傾向の著しい人。
- (6)高齢者。
- (7)次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1カ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渴くものの次の諸症：
せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み

【用法・用量】

下記の量を食前または食間にそのまま水かお湯で服用する。またはお湯を加えてかき混ぜて溶かし、熱いうちに服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
4才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後

<用法・用量に関する注意>

- 4才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。
- 溶かして服用した後、溶け残りがある場合にはお湯を加えて溶かし、残らず服用すること。

【成分・分量】

1日量3包（1包 2.0g）中

麻杏甘石湯エキス……………2.4g
〔マオウ……………4.0g カンゾウ……………2.0g
キョウニン……………4.0g セツコウ……………10.0g
より製した乾燥エキス〕

添加物：乳糖、白糖、ショ糖脂肪酸エステルを含有

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。



[麻杏甘石湯エキス顆粒「トーア」はこんなときに]



製品についてのお問い合わせは、下記までお願いします。

株式会社メディカルリーチ 神奈川県川崎市幸区南幸町3-1-2 ニチエーイン川崎25 2階
消費者相談窓口

電話：0120-556-436 受付時間／10:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

発売元

株式会社メディカルリーチ
神奈川県川崎市幸区南幸町3-1-2
ニチエーイン川崎25 2階

製造販売元

北日本製薬株式会社
富山県中新川郡上市町若杉55