

第2類医薬品

押して開ける

販売名：新生麻杏薏甘湯内服液

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 胃腸の弱い人。
(5) 発汗傾向の著しい人。
(6) 高齢者。
(7) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

用法・用量

次の量を、食前または食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈注意〉食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことをさします。食事中に服用するというではありません。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限(ケース及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- ビンをあけたら飲みきってください。
- ビンをあけたまま保存しないでください。

包装

30mL×3本入(1日分)

九州アスリート製薬

お問い合わせ ☎ 0120-756-810

製造販売元 新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

発売元 株式会社 エモメント「九州アスリート製薬」
福岡県福岡市博多区中洲5-3-8

関節痛

神経痛

飲んで効く漢方

30mL×3本(3回分)

効能・効果

体力中等度なものの次の諸症：関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)

成分・分量

本品1日量90mL(30mL×3本)中
麻杏薏甘湯濃縮液・・・81mL
(下記生薬の水製抽出液)
日局マオウ・・・4g
日局キョウニン・・・3g
日局ヨクイニン・・・10g
日局カンゾウ・・・2g
添加物：ハチミツ、白糖、パラベン、香料

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
https://www.pmda.go.jp/kenkou/higai_camp/index.html
☎0120-149-931(フリーダイヤル)