

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

漢方薬 抑肝散 シッカリ

不眠・不安・イライラに

■製品の特徴

本品は、7種類の天然生薬からなる漢方処方「抑肝散」配合の医薬品です。

ストレスによる自律神経のアンバランスを整え、神経のたかぶりからくる不眠症や神経症、女性ホルモンの変動に伴う精神不安など更年期障害にも効果があります。

- 自律神経に働きかけて精神を安定することで、「いろいろ考えて寝付けない」「夜中に目が覚めて眠れない」「熟睡できない」などの不眠症状を改善します。
- 緊張や不安からイライラしたり、気分が悪くなるといった神経の症状を緩和します。
- 女性ホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状、身体症状を改善します。
- 漢方薬のにおいや味が気になる方、顆粒が飲みづらいという方におすすめの錠剤タイプです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)胃腸の弱い人。
- (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
心不全	動くと息が苦しい、疲れやすい、足がむくむ、急に体重が増えた。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：

不眠症、神経症、更年期障害、血の道症、歯ぎしり、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）

〈効能・効果に関する注意〉

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期などの女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことです。

■ 用法・用量

次の量を、食前または食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	4錠	3回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)食間とは食後2～3時間を指します。

■ 成分・分量（成人の1日量12錠中）

抑肝散乾燥エキス（11／20量）……………1.88g

〔チョウツウコウ・トウキ・センキュウ各1.65g、ブクリョウ・ビャクジュツ各2.2g、サイコ1.1g、カンゾウ0.825g 上記生薬より抽出〕

添加物として、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、乳糖水和物、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ステアリン酸を含有する。

〈成分に関する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電話：0744-33-8855

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245番地