

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】抑肝散加陳皮半夏

ホノミヨクゲン錠

第2類医薬品

販売名：ホノミヨクゲン錠

540錠

▲ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸の弱い人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、更年期障害、血の道症[※]、歯ざしり

注）血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

【用法・用量】

次の量を食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	6錠	3回
15歳未満 7歳以上	4錠	
7歳未満 5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 18錠(3.6g)中

カンゾウ	0.75g	} 抑肝散加陳皮半夏 エキス(1/2量)・・・2.100g
サイコ	1.0g	
センキュウ	1.5g	
ソウジュツ	2.0g	
チョウトウコウ	1.5g	
チンピ	1.5g	
トウキ	1.5g	
ハンゲ	2.5g	
ブクリョウ	2.0g	

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

販売元 PharmaX株式会社
東京都文京区本郷5-25-18
ハイテック本郷ビル102

お客様相談窓口: ☎03-4500-2141
公式LINEではいつでも薬剤師に
ご相談が可能です



製造販売元 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931