

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

胃酸逆流、胸のムカムカなどで

みぞおちがつかえる方

ギャクリア[®]

漢方

販売名: ギャクリア

第2類医薬品 漢方製剤

製品特徴

- 漢方薬 六君子湯(りっくんしとう)が、胃液の排出機能を正常化し、胃痛、嘔吐を治していきます
- くり返す胃の不調を機能面から改善していきます

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|---|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる |

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

| 年 齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-----------|-----------|------|
| 大人(15才以上) | 1包 | 1日2回 |
| 15才未満 | × 服用しないこと | |

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量(2包:3.6g)中

六君子湯エキス(1/2量) …… 1.9g

| | |
|--------|-------|
| ニンジン | 2.0g |
| ソウジュツ | 2.0g |
| ブクリョウ | 2.0g |
| ハンゲ | 2.0g |
| チンピ | 1.0g |
| タイソウ | 1.0g |
| カンゾウ | 0.5g |
| ショウキョウ | 0.25g |

より抽出

添加物として、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al、l-メントール、プロピレングリコール、無水ケイ酸、乳糖を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎ **0120-5884-01**
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN 10162649