

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

# ハイリックン

(六君子湯エキス製剤)

第2類医薬品

## 特 徴

ハイリックンは、六君子湯（りっくんしとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、体の虚弱な方で、胃腸が弱く、胃に水がたまってチャプチャプ音がしたり、胃のあたりがつかえて食欲がなく、下痢ぎみでこのため疲れやすくて貧血傾向があり、手足の冷えやすい人の胃炎や胃腸虚弱の諸症状に、おだやかですぐれた効きめをあらわします。



## 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状   |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。   |
| 肝機能障害               | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能又は効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいもの次の諸症：  
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

## 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します)

| 年 齢       | 1 回 量           | 1 日服用回数 |
|-----------|-----------------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1包              | 3 回     |
| 15歳未満7歳以上 | $\frac{2}{3}$ 包 |         |
| 7歳未満4歳以上  | $\frac{1}{2}$ 包 |         |
| 4歳未満2歳以上  | $\frac{1}{3}$ 包 |         |
| 2歳未満      | $\frac{1}{4}$ 包 |         |

## <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分及び分量

本剤3包（1包2.5g）中に、次の生薬から抽出された六君子湯エキス4.4gが含まれています。

|            |    |            |      |
|------------|----|------------|------|
| ニンジン（人参）   | 4g | チンピ（陳皮）    | 2g   |
| ビャクジュツ（白朮） | 4g | ショウキョウ（生姜） | 0.5g |
| ブクリョウ（茯苓）  | 4g | タイソウ（大棗）   | 2g   |
| ハンゲ（半夏）    | 4g | カンソウ（甘草）   | 1g   |

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

- 本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

## 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6  
電話（06）6629-9058  
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2