

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

61

錠剤 六君子湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

〔用法・用量〕

食前1時間、温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本剤100錠中）

			自社製別紙規格				
日局	ビャクジュツ末	4.25 g	日局	ニンジン	4.25 g	} 別水性 紙工 規格ス 2.5 g	
日局	ブクリョウ末	4.25 g	日局	ビャクジュツ	4.25 g		
日局	ショウキョウ末	2.00 g	日局	ブクリョウ	4.25 g		
日局	カンゾウ末	1.25 g	日局	ハンゲ	4.25 g		
日局	ニンジン末	4.25 g	日局	ショウキョウ	2.25 g		
別紙規格	ハンゲ末	4.25 g	日局	タイソウ	2.25 g		
局外生規	チンピ末	2.25 g	日局	カンゾウ	1.25 g		
			日局	チンピ	2.25 g		

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ，なるべく湿気の少ない，涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ，品質を保持するために，他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと，場合によっては虫，カビ等がつくことが考えられますので，上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は，原料として天然の生薬を用いていますので，製品により多少色が異なったり，開栓後，吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが，効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土，日，祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10