

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 苓姜朮甘湯

リョウキョウジュツカントウ

ウチダの苓姜朮甘湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
 - むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|-----------|---|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
 - (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

腰に冷えと痛みがあって、尿量が多い次の諸症：腰痛、腰の冷え、夜尿症

用法・用量

| 年齢 | 1日量 |
|-----------|---|
| 大人（15歳以上） | 1袋（1日分）につき、水約500mLを加え、あまり強くない火にかけ、約半量に煮つめ、袋をとり出し、3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。 |
| 15歳未満 | 服用しないこと |

成分・分量

| | |
|------------|-------|
| 本品1袋（1日量）中 | |
| ブクリョウ | 6.0g |
| ビャクジュツ | 3.0g |
| カンゾウ | 2.0g |
| カンキョウ | 3.0g |
| 全量 | 14.0g |

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8