

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋漢方の 苓桂朮甘湯エキス顆粒

(りょうけいじゅつかんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に記載されている苓桂朮甘湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (5) 次の症状のある人。：むくみ |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病 |
| (3) 高齢者。 | |
| (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 | |

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するもの次の諸症：神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛

[用法・用量]

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサシ(すり切り1.0g)を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3.0g	3回	7才未満4才以上	1.5g	3回
15才未満7才以上	2.0g		4才未満2才以上	1.0g	
		2才未満	0.75g以下		

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1日量9.0g中]

日本薬局方 フクリョウ…………… 6.0g	日本薬局方 バクジュツ…………… 3.0g
日本薬局方 ケイヒ…………… 4.0g	日本薬局方 カンゾウ…………… 2.0g
	より製した水製乾燥エキス…………… 1.66g
	添加物として、乳糖、パレイショデンプンを含む。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号