

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

苓桂朮甘湯

(りょうけいじゅつかんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に収載されている苓桂朮甘湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起したことがある人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5) 他の症状のある人。 : むくみ
- (3) 高齢者。 (6) 次の診断を受けた人。 : 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものに用いる。

神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛。

【用法・用量】

大人（15才以上）は1包（1日量）につき水400mLを加えあまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともに煎じかすを取り去り、食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。小人（15才未満）は同様に煎じて食間空腹時に温服して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数
大人(15才以上)	全 量	3～2回 に分けて	15才未満 7才以上	2/3量	
			7才未満 4才以上	1/2量	
			4才未満 2才以上	1/3量	3回に分けて
			2才未満	1/4量以下	

【用法・用量に関する注意】

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 2歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

(3) 用途・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1包（1日量）15.0g中]

日本薬局方 ブクリヨウウ	6.0g	日本薬局方 ピャクシユツ	3.0g
日本薬局方 ケイヒ	4.0g	日本薬局方 カンゾウ	2.0g

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れかえないこと。

(4) 煎じ葉は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号