

聴命箋

△使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。

むくみ
 - 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能又は効果》

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：
立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

《用法及び用量》

次の量を1日2回食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成 人 (15歳以上)	4 錠	2 回
15歳未満 5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないこと	

《用法・用量に関連する注意》

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

《成分及び分量》

聴命箋の1日量（8錠）中には下記生薬より得た苓桂朮甘湯エキス（1/2量）1000mgを含む。

ブクリョウ ……3.0g ビャクジュツ ……1.5g
ケイヒ ……2.0g カンゾウ ……1.0g

添加物として、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、無水ケイ酸、セルロースを含有する。

《保管及び取扱い上の注意》

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

株式会社メディカルリーチ 「消費者相談窓口」
〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-1-2
ニチエーイン川崎25・2階
電話：0120-249-072
受付時間 / 10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

発 売 元 **株式会社メディカルリーチ**

神奈川県川崎市幸区南幸町3-1-2 ニチエーイン川崎25・2階

製造販売元 **中村薬品工業株式会社**

奈良県高市郡高取町丹生谷31.32番地