

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## マルホの苓桂朮甘湯

マルホの苓桂朮甘湯は、漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異のにおいがある。

苓桂朮甘湯は、体力中等度以下で、立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどくのぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く尿量減少して、口唇部がかわくものに適している。

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) むくみのある人。
- (8) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【他の注意】

服用に際して、次のことに注意してください。

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこし去ること。
- (3) 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないこと。
- (4) 本剤は、小児（15歳未満）に服用させないこと。

### 【効能・効果】

めまい、ふらつきがあり、又は動悸があり尿量が減少するものの次の諸症に用いる。神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛

### 【用法・用量】

大人は1袋（1日量）につき水約600mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、袋をとり出し煎液を通常2～3回に分けて食前または食間空腹時に温服する。

### 【成分・分量】

本品1袋（1日量）15.0g中

日局ブクリヨウ 6.0g 日局ケイヒ 4.0g 日局ビヤクジュツ 3.0g  
日局カンゾウ 2.0g

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。

お問い合わせ先

堀江生薬株式会社 お客様相談室

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

☎ 06-6231-1890

製造販売元

堀江生薬株式会社

〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町367-1