

## 関節のはれや痛み

第2類医薬品

# ミズナイン

### 効能・効果

体力中等度以上で、冷えがあって、むくみがあり、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症：むくみ、関節のはれや痛み、筋肉痛、湿疹・皮ふ炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み

### 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

| 年 齢       | 1回量       | 服用回数 |
|-----------|-----------|------|
| 大人(15才以上) | 4錠        | 1日3回 |
| 15才未満     | × 服用しないこと |      |

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

### 成分・分量

1日量(12錠)中 越婢加朮附湯エキス 2.6g

マオウ 3.0g、セッコウ 4.0g、ソウジュツ 2.0g、ブシ末 0.5g、ショウキョウ 0.5g、  
カンゾウ 1.0g、タイソウ 1.5g より抽出(添加物：無水ケイ酸を含む)

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、乳糖、ステアリン酸Mgを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります



小林製薬

## 60錠

5日分

税 控 除 対 象

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

販売名：ミズナイン

漢方製剤 第2類医薬品

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

### △ 使用上の注意

#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人(6)発汗傾向の著しい人(7)高齢者(8)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(9)次の症状のある人：むくみ、排尿困難(10)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状                 |
|------|---------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ           |
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感      |
| その他  | 動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称           | 症 状                                            |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる |

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室  
0120-5884-01  
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北4-4-66