

Medicine for Low
Pressure Disorder

漢方製剤

第2類医薬品

販売名: テイラックカンセクト 桂枝二越婢一湯加朮附錠

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 (6) 発汗傾向の著しい人 (7) 高齢者 (8) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (9) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (10) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに右記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度以下で、冷えがあって、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症: 関節のはれや痛み、筋肉痛、腰痛、頭痛

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

MADE IN JAPAN

用法・用量 大人(15才以上) 1回4錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(15才未満は服用しないこと) <用法・用量に関連する注意>定められた用法・用量を厳守すること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます **成分・分量** 1日量(12錠)中 桂枝二越婢一湯加朮附エキス 2.59g [ケイヒ・ジャクヤク・カンゾウ・マオウ 各 1.25g、ショウキョウ・ブシ末 各 0.5g、タイソウ・セッコウ・ソウジュツ 各 1.5g より抽出] 添加物として、クロスCMC-Na、CMC-Ca、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mg、タルク、セルロースを含有する ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いいたします

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川 1-30-3

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

税 控除 対象