

服用に際して、この説明書を必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名：ウィルラック

漢方製剤

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

📖 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: 排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢

4. 5～6日間(発熱、悪寒、頭痛、はきけに服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度以上で、激しい感冒様症状を示すものの次の諸症: 発熱、悪寒、頭痛、四肢の痛み、口渇、不眠、鼻腔乾燥、食欲不振、はきけ、全身倦怠

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	4錠	1日3回
15才未満	× 服用しないこと	

成分・分量 1日量(12錠)中

柴葛解肌湯エキス 2.4g

サイコ 2.0g、カッコン 2.0g、マオウ 1.25g、
ケイヒ 1.0g、オウゴン 1.0g、シャクヤク 1.0g、
ハンゲ 1.5g、ショウキョウ 0.5g、カンゾウ
0.5g、セッコウ 3.0g により抽出

添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、ケイ酸
Al、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、
錠剤の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めの
お店又はお客様相談室に
お願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN