

【販売名】  
晴天之才錠  
(せいてんのさいじょう)  
薬効名:漢方薬

押してあける

第2類医薬品

#### 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症: かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

#### 用法・用量

次の量を食前又は食間<sup>※</sup>に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

<sup>※</sup>「食間」とは食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること。

#### 成分・分量

本剤15錠(5.25g)中(キクカ1.5g・クコシ2.5g・サンシュユ2.0g・サンヤク2.0g・ジオウ4.0g・タクシャ1.5g・ブクリョウ1.5g・ボタンビ1.5g) 杞菊地黄丸料エキス4.3g  
添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

この説明書は服用前に必ずお読みください。  
また、必要時に読めるよう保管しておいてください。

#### 使用上の注意

##### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp> ☎ 0120-149-931

だいにち堂

晴天之才錠

視力低下に飲んで効く<sup>\*</sup>

450錠 30日分

第2類医薬品

※体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿の方

#### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- ぬれた手で触れないでください。又、一度取り出して手に乗せた錠剤は元に戻さないでください(変質防止のため)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元 株式会社だいにち堂

長野県安曇野市穂高柏原2843-28

製造販売元 劑盛堂薬品株式会社

和歌山市太田二丁目8番31号

本製品についてのお問い合わせは、  
下記にお願い申し上げます。

だいにち堂

問合せ先

☎ 0120-315-531

月～金/9:00～12:00、13:00～18:00