

✂ ここからお切りください。-----

開封後はチャックを閉めて保存してください。

漢方製剤



よろず杞菊地黄丸錠

こぎくじおうがんじょう



第2類医薬品

60錠(4日分)

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症：かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

用法・用量

次の量を1日3回 食前又は食間に水又は白湯で服用して下さい

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

成分・分量

1日量15錠(5.25g)中(キクカ1.5g・クコシ2.5g・サンシュユ2.0g・サンヤク2.0g・ジオウ4.0g・タクシャ1.5g・ブクリョウ1.5g・ボタンビ1.5g)杞菊地黄丸料エキス4.3g
添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。



ここからお切りください。-----

開封後はチャックを閉めて保存してください。

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

チ
ラ

第2類医薬品

内容量 60錠
(4日分)

こぎくじおうがんじょう

販売名：よろず杞菊地黄丸錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、 胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをして保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【お問い合わせ】

花さらさ【薬店名】よろず漢方堂
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

 0120-202-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【発売元】

株式会社フォーリーフ製薬
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

【製造販売元】

大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川西町632-1

副作用被害救済制度

 0120-149-931

製造番号

使用期限



漢方薬