

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

こぎくみょうけんがん

杞菊妙見丸

商品番号

E306

本剤は、漢方の古典「医級」^{いきゅう}に記載された処方^{いさく}に準拠して製造された丸剤です。

老化は目からくる、ともしばしばいわれるように、中高年になると疲れやすくなったり、トイレが近い、気持よく出ない、などといった症状とともに、目が疲れやすくなる、目が充血したり痛みを覚えるとか、かすんで細かな字が見にくくなったりすることがあります。

これは若い人でもパソコンなどのOA機器で目を酷使したあとなどにもみられる現象ですが、中医学では肝腎陰虚^{かんじんいんきょ}によって起こるとされています。

杞菊妙見丸^{こぎくみょうけんがん}は、六味地黄丸^{ろくみじおうがん}に枸杞子^{くこし}（クコの実）と菊花^{きくか}（菊の花）を加えた漢方薬です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症：

かすみ目、つかれ目、視力低下、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ

(裏面につづく)

【用法・用量】

水又は白湯（さゆ）で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15歳以上）	8丸	3回
15歳未満	服用しないでください	


【成分・分量】

成分・分量（本剤24丸中）	
クコシ……………0.288 g	サンヤク……………0.576 g
キクカ……………0.288 g	ブクリョウ……………0.432 g
ジオウ……………1.152 g	ボタンピ……………0.432 g
サンシュユ……………0.576 g	タクシャ……………0.432 g
を含有しています。	

添加物として滑石、ハチミツを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。
水分は丸剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で丸剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
(詰めものは、輸送中に丸剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることや、丸剤がくっつくことがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

発売元

 小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号

製造販売元

八ッ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14