

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。たく しゃ とう
沢瀉湯

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D284

中国の民間話話「白蛇伝」
に登場する女性を伝統的な
漢方のイメージとしてシン
ボルマークとしたものです。

日常生活において、周囲がぐるぐる回って見えたり、ふわふわと足が地についていないような感じがするなどの症状がめまいの特徴です。めまいは、いろいろな病気に伴って発生しますが、漢方では頭部の水分代謝がうまく働かないために起きると考えられています。

沢瀉湯エキス細粒G「コタロー」は、みぞおちあたりがつかえ、頭にものをかぶったような頭重感から、立つことや歩くことが難しくなったり、横になって目をとじていても、グルグル回っているような激しいめまいに用いられるお薬です。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠または妊娠していると思われる人。

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

めまい、頭重

〈効能・効果に関する注意〉

体力に関わらず、使用できる。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を持ちます。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包 または 1.5g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.0g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 0.75g	
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.5g	
2歳未満	1/4包 または 0.37g	

（大入り剤に添付のサジは、すり切り一杯で約0.6gです）

〈用法・用量に関する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(4.5g)中

タクシャ 4.8g ビャクジュツ 2.4g

より抽出した水製エキス2.0gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、アメ粉を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。



(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤つて水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。



(5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(分包剤のみ)

(6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。

(大入り剤のみ)

(7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

(8)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。

(大入り剤のみ)



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド

請求券



D284 A27

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06(6371)9106

A272Z

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

商品番号
Q284

めまい 頭重に

販売名 沢瀉湯エキス細粒G「コタロー」

日常生活において、周囲がぐるぐる回って見えたり、ふわふわと足が地についていないような感じがするなどの症状がめまいの特徴です。そのような時に応用されるのがこのお薬です。

頭にものをかぶったような頭重感から、立つことや歩くことが難しくなったり、横になって目をとじていても、ぐるぐる回っているようなめまいに効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠または妊娠していると思われる人。

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

めまい、頭重

〈効能・効果に関連する注意〉

体力に関わらず、使用できる。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。

【成分・分量】


成分・分量 本剤3包（4.5g）中

タクシャ……………4.8g ビャクジュツ……………2.4g
より抽出した水製エキス2.0gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、アメ粉を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄に、箱を開封した日付を記入してください。



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
 ☎フリーダイヤル0120(149)931

製造販売元 小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号