



JPS 漢方顆粒－83号

漢方製剤

販売名 サンワロンY顆粒

本剤は、漢方処方「芍薬甘草附子湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、冷えを伴うものの次の諸症：こむらがり、筋肉のけいれん、胃痛、腹痛、腰痛、神経痛

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

年 令	1 回 量
成人(15才以上)	1～2包
15才未満	服用しないこと

〔用法・用量に関連する注意〕

食間とは食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

本品1日量……………6包(1包0.75g)中

サンワロンY水製エキス……………1.5g

〔日局シャクヤク……………4.5g〕
〔日局カンゾウ……………4.5g〕

日局ブシ末……………1.5g

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Caを含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は吸湿性が高いので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電 話 045-593-2136

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社

横浜市都筑区東山田4-42-22

製造販売元 三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1