

# サンワロンC 顆粒

かっこん かじゅつぶ とう  
葛根加朮附湯による

サンワロンC顆粒は、漢方処方「葛根加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 著しく胃腸の弱い人。
- (4) 発汗傾向の著しい人。
- (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状                 |
|-------|---------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ           |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感      |
| そ の 他 | 動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称           | 症 状   |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、<br>脱力感、筋肉痛があらわれ、<br>徐々に強くなる。 |

#### 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人(15才以上) | 1~3包    |
| 15才未満     | 服用しないこと |

## 成 分

本品1日量 …………… 9包(1包0.8g) 中  
サンワロンC水製エキス …………… 3.375g

|             |        |            |        |
|-------------|--------|------------|--------|
| カッコン……………   | 4.500g | ソウジュツ…………… | 3.375g |
| マオウ……………    | 3.375g | ケイヒ……………   | 2.250g |
| ショウキョウ…………… | 3.375g | シャクヤク…………… | 2.250g |
| タイソウ……………   | 3.375g | カンゾウ……………  | 2.250g |

上記の生薬より抽出したエキス

加工ブシ末 …………… 1.125g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Caを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

\*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770  
10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

## 適応症

悪寒発熱して頭痛があり、項部、肩背部に緊張感あるもの。  
肩こり・肩甲部の神経痛・上半身の関節リウマチ。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1