

生薬製剤  
キ キョウセツ コウ  
**JPS桔梗石膏エキス錠N**

桔梗石膏は、たんを除き、膿を排出し、炎症を鎮める働きがあります。  
本剤は、桔梗と石膏の生薬を抽出し、エキスとした後、服用しやすい錠剤  
としました。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。  
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、  
直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売  
者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、軟便

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の  
持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持っ  
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付  
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

去痰、排膿

## 用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
7才以上15才未満	2錠	
7才未満	服用しないこと	

食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

食間とは…食後2～3時間を指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

 9錠中

桔梗石膏エキス1.54gを含有しています。

成分	含量	成分	含量
日局キキョウ	2.0g	日局セッコウ	5.0g

上記生薬量に相当します

添加物として、CMC-Ca、ケイ酸Al、トウモロコシデンプン、セルロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

☎ 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

生薬製剤  
**JPS 桔梗石膏エキス錠N**

桔梗石膏は、たんを除き、膿を排出し、炎症を鎮める働きがあります。  
本剤は、桔梗と石膏の生薬を抽出し、エキスとした後、服用しやすい錠剤としました。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、軟便
- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

去痰、排膿

## 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	3 錠	3 回
7 才以上 15 才未満	2 錠	
7 才未満	服用しないこと	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 食間とは食後2～3時間を指します。

## 〔成分・分量〕

9錠中

桔梗石膏エキス 1.54gを含有しています。

〔 日局キキョウ…………… 2.0g                      日局セッコウ…………… 5.0g 〕  
上記生薬量に相当します

添加物として、CMC-Ca、ケイ酸Al、トウモロコシデンプン、セルロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- (6)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記をお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電話 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22