

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

こり固まった背・肩の痛みに飲んで内側から効く



- ◆コリッシュは、ストレスの多い現代人の背・肩のこりと痛みの内服薬です。日常生活でさらされるストレスにより起こる肩から背中まで広がるこり固まった痛みを改善します。
- ◆江戸時代に漢方医家・中山撰州せつしゅうが、日本人のために創方した「治肩背拘急方」ちけんはいこうきゅうほうに基づいた漢方製剤です。



使用上の注意



相談すること

① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- ③ 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- ④ 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

神経質のもので、背・肩に凝りつける下記諸症状に用いる。
肩凝り症、背・肩の疼痛

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

年 令	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1包	1日3回
15才未満	服用しないこと	

食間の服用は、食事の後2～3時間を目安にします

【注意】定められた用法・用量を厳守してください。

成 分

1包(1.2g)中

成 分	分量	はたらき
治肩背拘急方エキス末 (下記生薬の抽出乾燥エキス)	533.33mg(3包中1600mg)	緊張からくる、こり固まった肩から背中 まで広がった痛みをやわらげます。
セイヒ(青皮)	1333.33mg(3包中4000mg)	
ウヤク(烏薬)	1000.00mg(3包中3000mg)	
ガジュツ(莪朮)	1000.00mg(3包中3000mg)	
ブクリョウ(茯苓)	1333.33mg(3包中4000mg)	
カンゾウ(甘草)	333.33mg(3包中1000mg)	
コウブシ(香附子)	1000.00mg(3包中3000mg)	

添加物：タルク、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

【注意】

本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記
にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

ジェーピーエス製薬株式会社
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)