


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

かん せい
肝 生
（生薬製剤）

- ◆「肝生」は肝臓機能障害、急・慢性肝炎、肝臓肥大、胆のう炎、黄疸を改善するために、12種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

 **使用上の注意**



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- （4）胃腸が弱く下痢しやすい人。
- （5）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- （6）次の医薬品を服用している人。
便秘薬（下剤）

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

*まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- *5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

肝臓機能障害、急・慢性肝炎、肝臓肥大、胆のう炎、黄疸

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1 包 (2g)	3 回
15歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します。

サンソウニン	1.46g	ニ ン ジ ン	1.46g
サ ン シ シ	1.46g	シ ャ ゼ ン シ	1.46g
ソ ウ ハ ク ヒ	1.46g	キ シ ツ	1.46g
シ ュ ク シ ャ	1.46g	ケ イ ヒ	0.37g
ダ イ オ ウ	0.37g	ウ バ イ	1.46g
キ ッ ピ	1.46g	ガ イ ヨ ウ	1.46g

添加物として乳糖水和物及びカルメロースナトリウムを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)