

この添付文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。

和漢薬製剤

第2類医薬品

心胃 萬病感應丸

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の強心薬

●相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (一) 医師の治療を受けている人
 - (二) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 五〜六日間(胃腸虚弱、消化不良、小児五疳の改善目的で服用する場合は一カ月間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

動悸、息切れ、気つけ、胃腸虚弱、消化不良、下痢、ひきつけ、小児五疳

■用法・用量

次の量を朝夕食後三十分以内に白湯又は清水で服用してください。

年齢	一回量	一日服用回数
大人(十六歳以上)	半月形一個	二回
十五歳以下七歳以上	半月形1/2個	二回
七歳未満	服用しないこと	

- (一) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (二) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量

二個八〇〇μg中に次の成分を含有しています。

ジャコウ	四	mg
人参末	三〇〇	mg
ゴオウ	一〇	mg
沈香末	五〇	mg
牛胆	一五	mg
真珠	一〇	mg

添加物としてバレイシヨデンブン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、デヒドロ酢酸Na、dホルネオール、マクロゴール、銀箔を含有します。

■保管及び取扱以上の注意

- (一)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (二)小児の手の届かない所に保管してください。
- (三)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (四)一個を分割した残りは、アルミシート袋に戻し、袋の口を折って湿気の少ない涼しい所に保管し、なるべく早く服用してください。
- (五)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は左記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話 〇七四八一五二一一二三三

受付時間 九時～一七時(土、日、祝日を除く)

製造販売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田一九