

さいこそかんとう

柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27

本品は、現代の複雑化した社会で、ストレスなどが原因の情緒不安定や、イライラから起こる腹痛や胸・脇痛などに奏効します。気の滞りを改善する代表処方である四逆散に川芎、青皮及び香附子を加え、気を巡らす働きが更に強化されています。



●使用上の注意●



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)

(4)高齢者

(5)次の症状のある人 むくみ

(6)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位(腹痛に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力中等度で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに頭痛や肩背がこわばるものの次の諸症：

腹痛、側胸部痛、神経痛

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)は

サイコ……………3g	コウブシ……………2.25g
シャクヤク……………3g	センキュウ……………2.25g
キジツ……………2.25g	セイヒ……………1.5g
カンゾウ……………1.5g	

上記より製した柴胡疏肝湯エキス6.9g(乾燥物換算で約2.8gに相当)を含有する細粒剤です。添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、デキストリン、軽質無水ケイ酸、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お客様相談について●

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの店舗又は下記にお願い申し上げます。

三井薬品株式会社「お客様相談係」

電話：03-5809-2790 月～金曜日9：00～17：00（祝日を除く）

発売元

三井薬品株式会社

東京都千代田区岩本町2-10-2 神田ウサミビル8階

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**

愛知県名古屋市中区円上町24-21