



この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

び えん こう
中薬 鼻淵膏

第2類医薬品

（生薬製剤）

中薬鼻淵膏は、蒼耳子と辛夷を主薬とした製剤で、鼻汁の排出を促進し、鼻粘膜の炎症をやわらげ、鼻の通りをよくする作用があります。

中薬鼻淵膏は、シロップ剤でのみやすく、食間や就寝前の服用が効果的です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人 高熱
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、吐き気・嘔吐

3. 1ヵ月位（感冒時の鼻づまりに服用する場合は、5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■成分・分量 1日量（15mL）は

ネオチクジロン水製エキス …… 14.67g

ソウジシ（蒼耳子） …… 30g	キンギンカ（金銀花） …… 1.88g
シンイ（辛夷） …… 5.63g	アカネコン（茜根） …… 1.88g
キクカ（菊花） …… 1.88g	より製したエキス

を含有するシロップ剤です。

添加物として、プロピレングリコール、安息香酸Na、パラベン、ハチミツ、単シロップ、ℓ-メントール、クエン酸、エタノールを含有します。

■効能・効果

感冒時の鼻づまり、鼻炎、蓄膿症

（裏面に続く）

■用法・用量

次の量を温湯で希釈して服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	5mL	3回
15才未満7才以上	3.3mL	
7才未満4才以上	2.5mL	
4才未満2才以上	1.7mL	
2才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)服用の際は、添付の計量カップをご使用ください。
- (4)計量カップは、ご使用のつど、水洗いして清潔に保管してください。

■保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4)本剤は生薬成分を含むため、色や味に多少の違いが生じることがありますが、品質上問題はありません。
- (5)まれに沈澱を生ずる場合がありますが、薬効に変わりありません。服用の際は、よく振ってから服用してください。
- (6)服用のつど、ビンの口をよく拭いてからキャップをしめてください。ビンの口に薬液が付着したままキャップをしめると、まれに開けにくくなる場合があります。また、しめ方が悪いと薬液が流れ出たり、汚染することがあります。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売(輸入)元

松浦薬業株式会社

名古屋市緑区大高町寅新田36