

ワンダーエース

第②類医薬品

本剤は、かぜ、咽喉炎、へんとう腺炎などの症状に効果をあらわします。

* ! 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳祛痰薬

2. 長期連用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (5) 次の症状のある人。《高熱、むくみ》 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (6) 次の診断を受けた人。《甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病》 |
| (3) 高齢者。 | |
| (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 | |

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれて、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

感冒、咽喉炎、へんとう腺炎。

用法・用量

一日3回服用する。

年齢	1回量
大人	10mL
15～8才	5 mL
7～5才	3 mL
5才未満	服用しないこと。

用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

カッコンエキス 800mg

(30mL中)

{ マオウ4g、ハンゲ5g、コウボク2g
カンゾウ1g、ケイヒ3g、ヤカン5g } のエキス…2,800mg

プラントール（車前草エキス） 500mg

添加物として白糖、デヒドロ酢酸ナトリウムを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わること。)
- (4) 本剤は沈殿を生じても薬効に影響はありません。
よく振ってから服用すること。
- (5) 閉栓後は冷暗所に保存すること。
- (6) 使用期限(外箱に記載)の過ぎたものは使用しないこと。

本剤をご使用になられて、変った症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元

電話：088-666-0678

有限会社 日本漢方医薬研究所

ホームページ：<http://nihonkampo.com/>

徳島県鳴門市北灘町櫛木字井ノ尻89-7

受付時間：10:00～17:00（土、日、祝日を除く）