



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### <保管及び取扱い上の注意>

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。2. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。) 4. 湿気などにより薬が変質することがありますので、次のことに注意して下さい。1) 服用のつどフタを固く締めて下さい。2) めれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないで下さい。5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

4  
992402107530



# 杞菊妙見

顆粒<sup>®</sup>

500g

## 杞菊妙見顆粒<sup>®</sup>

第2類医薬品

■効能・効果 体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症：かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

■用法・用量 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3.0g	3回
15歳未満	服用しないこと	

添付の匙は、軽くすり切り1杯で約3.0gです。

■成分 成人1日の服用量9.0g中に下記成分及び分量より得た杞菊地黄丸料エキス末5.4gを含んでいます。

〔クコシ 1.5g    キクカ 1.5g    ジオウ 6.0g〕  
〔サンシュヨ 3.0g    サンヤク 3.0g    ブクリョウ 2.25g〕  
〔ボタンピ 2.25g    タクシャ 2.25g〕

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

<成分に関連する注意>本剤は天然物(生薬)を用いていますので、顆粒の色や味が多少異なることがあります。

ハツ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀 2-14-14



容器、キャップ  
フィルム、スプーン

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。 使用期限  
ハツ目製薬株式会社(お客様相談室) 製造番号  
電話 (03) 3680-0005  
受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日を除く)