

ネオアスゲン[®]顆粒

ネオアスゲン顆粒は、中国伝統医学の古典「傷寒論」に記載されている「麻黄附子細辛湯」を基にした漢方処方製剤です。手足に冷えがあり、ときに悪寒がある方の、感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛にすぐれた効果をあらわします。

⚠️ 〔使用上の注意〕



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。排尿困難
 - 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身倦怠感、発熱、動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1 ヶ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症：
感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛

〔用法・用量〕

下記1回量を1日3回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	成人 (15歳以上)	15歳未満
1回量	1包	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量〕

褐色の顆粒剤で、3包（成人1日服用量：3.6g）中に、次の成分を含有します。

麻黄附子細辛湯乾燥エキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,400mg


（マオウ4.0g、ブシ1.0g、サイシン3.0gより抽出）

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、二酸化ケイ素、アセスルファムK、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有します。

※本剤は、生薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3370-7174(代表)

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 **日邦薬品工業株式会社** 製造販売元 **アスケン製薬株式会社**

東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008