

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

11

かん  
還

せい  
精

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1)胃腸の弱い人。
- (2)下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

疲労倦怠感が著しく腰冷、腰痛があり、四肢は冷え易いが時にほてることもあり、口渇があり、排尿回数多く、尿量減少して残尿感がある場合と、逆に尿量が増大する場合がある、特に夜間多尿のものに用いる。

糖尿病、腎臓病、老人性腰痛、坐骨神経痛、高血圧症、湿疹、産後脚気

〔用法・用量〕

食前1時間、又は空腹時、温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	10～15錠	3回

〔成分・分量〕（本品100錠中）

		自社製別紙規格				別水 紙製 工手 規格 1.0g
日局	ケイヒ末	0.6g	日局	ケイヒ	0.8g	
日局	タクシャ末	1.2g	日局	ジオウ	2.4g	
日局	プクリョウ末	1.2g	日局	タクシャ	1.4g	
日局	ポタンピ末	1.2g	日局	プクリョウ	1.4g	
局外生規	ジオウ末	1.9g	日局	ポタンピ	1.4g	
日局	サンヤク末	1.3g	日局	サンヤク	1.6g	
別紙規格	カンキョウ末	0.4g	日局	サンシュユ	1.4g	
局外生規	サンシュユ末	1.2g	日局	カンキョウ	0.4g	

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10