



服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

のどの痛み・せきに

じゅん ぱい とう しょう

潤肺糖漿

(生薬製剤)

第2類医薬品

■特徴

「潤肺糖漿」は、清の時代の鄭梅潤著「重楼玉鑰」巻上(1817年)に養陰清肺湯として記されたものを原典とするお薬です。養陰清肺湯は、後に改良が加えられ、多用される処方の一つとして1963年版より中華人民共和国薬典に収載されています。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部圧迫感
精神神経系	めまい

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

のどの痛み、せき

■ 用法・用量

次の量を1日2回、水でうすめて服用してください。(添付計量カップ使用)

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
大人(15才以上)	10mL	2回
15才未満	5mL	

● 用法・用量に関連する注意

- (1) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないでください。なお、生後3ヵ月以上であつても2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 定められた用法・用量を厳守してください。水でうすめる目安は、2～5倍程度です。

■ 成分・分量

本品1日量(20mL)中

生薬混合エキス……………3.4g

ジオウ(地黄)……………1.67g	バクモンドウ(麦門冬)…1.0g
ボタンピ(牡丹皮)…0.67g	ハッカ(薄荷)……………0.42g
シャクヤク(芍薬)…0.67g	ゲンジン(玄参)……………1.33g
カンゾウ(甘草)………0.33g	

パイモエキス……………0.17g

[パイモ(貝母)……………0.67g]

添加物として、単シロップ、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料を含有する。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、なるべく涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 本剤は生薬製剤のため、まれに沈殿を生ずる場合がありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。
- (5) 服用のつど、瓶の口をよく拭いてからキャップをしめてください。
- (6) 添付の計量カップは、服用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (7) 使用期限内に服用してください。また、使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) 本剤の甘味成分がキャップに付着して開かないことがあります。この様な場合は、キャップ部を約40℃の温湯にししばらく浸してから開けてください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発売元 **イスクラ産業株式会社**
東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売
(輸入)元 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21

製造元 **中華人民共和国 天津楽仁堂製薬廠**