

【効能・効果】

体力おとろえ、貧血気味、冷え症の人の
慢性気管支炎、気管支喘息、肺気腫

第2類医薬品

生薬製剤

〔販売名〕

強水気散

〔内容量〕

1.5g×30包入

【成分・分量】 3包 (4.5g) 中

(キョウニン0.176g・ゴミシ0.132g)エキス0.453mL(固形物として0.088g)、
(キョウニン1.225g・ゴミシ0.368g・サイシン0.368g・ハンゲ0.735g・カンキョウ0.368g)エキス2.678mL
(固形物として0.123g)、カンゾウ末1.838g、ブクリョウ末2.451g

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますか、
効果に変わりはありません。

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)
次の人は服用しないでください。生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(5)次の症状のある人：むくみ(6)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

■発売元 源平製薬株式会社
富山県射水市黒河新 2643

お問い合わせ先 0120-108-058

受付時間 9:00～21:00 元日除く

■製造販売元 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

【用法・用量】次の量を、食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	
1歳以上15歳未満	2/3包	

年齢	1回量	1日服用回数
5歳以上10歳未満	1/2包	
5歳未満	1/3包	3回

＜用法・用量に関連する注意＞(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。(4)生後3ヵ月未満の乳児には服用させないでください。