

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

通 源 細 粒

第②類医薬品

本剤は、ダイオウ、センナの瀉下薬が主薬となって大腸の運動を整え、これに腹直筋のこりを緩和するシャクヤクを配して腹部膨満を去り、また腹痛、裏急に効くカンゾウを加えたもので便秘にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)低カリウム血症のある人。

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬（下剤）

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

4. 大量に服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。

(3)漢などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4)次の症状のある人。: はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

(5)消化管手術後の人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

[用法・用量]

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1/2~1包または 0.6~1.2 g	2回	11才未満 7才以上	1/4~1/2包または 0.3~0.6 g	2回
15才未満11才以上	1/3~2/3包または 0.4~0.8 g		7才未満	服用しないこと	

上記の量を朝夕の空腹時服用して下さい。ただし、初回は少量を用い、便通の具合や状態を見ながら少しづつ增量又は減量して下さい。なお、添付のサジはすり切り約1.2 gです。

[用法・用量に関する注意]

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 用法・用量を厳守すること。

(3) 次の人は服用量をひかえめにすること。: 身体の弱っている人、月経中の人の

[成分・分量]

[本品 1 日量2.4 g 又は 2 包(1包1.2 g) 中]

日本薬局方 ダイオウ末	0.85 g	日本薬局方 カンゾウ末	0.40 g
日本薬局方 センナ末	0.75 g	日本薬局方 シャクヤク末	0.40 g

[成分・分量に関する注意]

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがある。また、臨床検査値に影響を与えることがある。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない温湿の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。

(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。

(5) 本剤は生薬を原料とした製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の窓口先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

T584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号