

【生薬製剤】

強 気 上 散

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症*	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 1ヵ月位(急性結膜炎に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること*

効能・効果

眩暈^{a)}、神経衰弱、ヒステリー、消化不良、胃痛、胃酸過多、心悸亢進^{b)}、胃アトニー^{c)}、耳なり、急性結膜炎

a) 眩暈：めまいのことを示します。

b) 心悸亢進：動悸^{どうき}のことを示します。

c) 胃アトニー：胃の緊張や運動能力が低下した状態を示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
11歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
8歳以上11歳未満	大人の1/2の量(0.75 g)	1/2包	
5歳以上 8歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	1/3包	
3歳以上 5歳未満	大人の1/4の量(0.375g)	1/4包	
3歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

ビャクジュツエキス……	77.6mg	サ シ シ 末……	280.3mg
オウバク末……	560.4mg	ビャクジュツ末……	498.3mg
オウレン末……	840.7mg	ブクリョウ末……	996.4mg
カンゾウ末……	498.3mg	ニンジン末……	0.3mg
ケイヒ末……	747.4mg	サイコ末……	0.3mg

- ・本剤は黄褐色で、特異なにおいを有し、味は初めわずかに甘く後極めて苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

強気上散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号