

よくい にん  
薏苡仁錠 シンワS

## 【使用上の注意】



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器  | 胃部不快感     |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 【成分・分量】

本品1日量(9錠)中

ヨクイニンエキス……………720mg

(原生薬換算量 18000mg)

「日局」ヨクイニン末……………500mg

なお、添加物としてカルメロースCa、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、セルロースを含みます。

## 【効能・効果】

いぼ、皮膚のあれ

## 【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

(食間とは、食後2～3時間を指します。)

| 年 齢       | 1回量       | 1日服用回数 |
|-----------|-----------|--------|
| 成人(15歳以上) | 3錠        | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 2錠        |        |
| 7歳未満5歳以上  | 1錠        |        |
| 5歳未満      | 服用しないで下さい |        |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出ることがありますが、効果には変わりがありませんので安心して服用して下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## 【お問い合わせ先】

伸和製薬株式会社 情報管理室

〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号

電 話：03(3807)3780

受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

販 売 元 日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

http://www.nippo-yakuhin.jp/



発 売 元 伸和製薬株式会社

東京都荒川区南千住5丁目17番8号



製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地