

服用に際して、下記又はラベルの説明文をよくお読みください。

生薬製剤

第2類医薬品

# 大鵬かぜ内服液銀翹散

## ■特徴

大鵬かぜ内服液銀翹散は、中国の医書「温病条弁」に記載されている「銀翹散」を基本につくられたかぜ内服液です。のどの痛み、せき、頭痛などの症状のある風邪には、金銀花、連翹、羚羊角など10種の生薬を配合した「銀翹散」での治療が効果的です。

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



## ■ 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 高齢者
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人 むくみ
- (8) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起きることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

かぜによるのどの痛み・せき・口(のど)の渇き・頭痛

## 用法・用量

次の量を食間によく振ってから服用してください。

(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年齢	1 回量	1 日服用回数
成人 (15 歳以上)	1 本	3 回 (食間)
15 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

**成分・分量** 1日量90mL(30mL×3本)中

銀翹散エキス……………9.7g

原生薬として

キンギンカ(金銀花) …… 4.260g

レンギョウ(連翹) …… 4.260g

キキョウ(桔梗) …… 2.556g

カンゾウ(甘草) …… 2.556g

ハッカ(薄荷) …… 2.556g

タンズシ(淡豆豉) …… 2.136g

ゴボウシ(牛蒡子) …… 2.136g

タンチクヨウ(淡竹葉) …… 1.704g

ケイガイ(荊芥) …… 1.704g

レイヨウカク(羚羊角) …… 0.132g

添加物：白糖、果糖液糖、キシリトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、アルコール、香料(L-メントール)

(成分に関連する注意)

本剤は生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。

**保管及び取扱い上の注意**

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

**包 装**

1箱3本(30mL×3本)入り

副作用被害救済制度の問合せ先

**(独) 医薬品医療機器総合機構**[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

TEL0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

**大鵬薬品工業株式会社**

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

服用に際してはラベルをよく読むこと。

**△ 使用上の注意** **✕ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 短期間の服用にとどめ、連用しないで下さい。

**🏠 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 高齢者 (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (7) 次の症状のある人 むくみ (8) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

製造販売元

TAIHO

大鵬薬品工業株式会社  
東京都千代田区神田錦町1-27  
お客様相談室 TEL.03-3293-4509  
<http://www.taiho.co.jp/>

L1501

ガラス:瓶  
金属:キャップ

かぜによる

のどの痛み

せき  口の渇き

販売名 大鵬かぜ内服液銀翹散

# 銀翹散

ギンギョウウサン

30mL

第2類医薬品

**効能・効果** かぜによるのどの痛み・せき・口(のど)の渇き・頭痛

**用法・用量** 成人(15歳以上)は1回1本(30mL)を1日3回、食間によく振ってから服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●注意:(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残のないようにして下さい。

**成分・分量** 1日量 90mL(30mL×3本)中

銀翹散エキス9.7g<原生薬としてキンギンカ4,260g、レンギョウ4,260g、キキョウ2,556g、カンゾウ2,556g、ハッカ2,556g、タンズシ2,136g、ゴボウシ2,136g、タンチクヨウ1,704g、ケイガイ1,704g、レイヨウカク0,132g) 添加物:白糖、果糖液糖、キシリトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、アルコール、香料(M-メントール) ●注意:本剤は生薬成分を含むため、沈澱を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限

製造番号

