

第3類医薬品

日本薬局方

# ヨクイニン

販売名：高砂ヨクイニン



4 987574 100410

内容量：500g



**高砂薬業株式会社**

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

1901

LOT : 服用に際しては、裏面の説明文を必ずお読みください。

日本薬局方 第3類医薬品

## ヨクイニン

販売名：  
高砂ヨクイニン

⚠ 使用上の注意

 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能・効果】** いぼ、皮ふのあれ

**【用法及び用量】** 成人(15歳以上)は1日量30gを水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。(食間とは、食後2～3時間)

H30

**【保管及び取扱い上の注意】**

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
5. 本品は、窒素封入包装により保存性を高めてあります。開封後はその効果がなくなりますので、お早目にご使用ください。

◎万一製品に異常がありましたら、弊社までご連絡ください。

**高砂薬業株式会社**

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

お客様相談窓口 ☎072-977-7151

(9時～17時 土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
☎0120-149-931 (フリーダイヤル)  
<http://www.pmda.go.jp/>

H31