

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

こう し とう  
**口 紫 湯**

（ 生 薬 製 剤 ）

- ◆「口紫湯」は咽喉、口内、口唇の瘡、荒れ、腫痛を改善するために、17種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。  
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、下痢

\*まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- \*4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能・効果**

咽喉、口内、口唇の瘡、荒れ、腫痛

## 用法・用量

本品 1 包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水 550mL（約 3 合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 日分の 1/3 量	3 回
7 歳以上 15 歳以下	成人の 1/2 量	
4 歳以上 7 歳未満	成人の 1/3 量	
2 歳以上 4 歳未満	成人の 1/6 量	
2 歳未満	服用しないこと	

食間とは…  
食後 2～3 時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- （１）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （２）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本品 1 包（18.9g）中、下記生薬を含有します。

ニン シ ン	-----	1.0g	カ ン ソ ウ	-----	0.5g	シ ョ ウ キ ョ ウ	-----	0.2g
オ ウ レ ン	-----	2.0g	ソ ウ ジ ュ ッ	-----	1.0g	ト ウ キ	-----	1.5g
シ オ ウ	-----	1.5g	ポ タ ン ピ	-----	1.5g	ブ ク リ ョ ウ	-----	1.5g
シ ョ ウ マ	-----	1.5g	サ ン シ シ	-----	1.0g	セ ッ コ ウ	-----	1.0g
タイ ソ ウ	-----	0.2g	カ ロ コ ン	-----	1.5g	ポ ウ フ ウ	-----	1.0g
ゴ ボ ウ シ	-----	1.0g	ケ イ ガ イ	-----	1.0g			

添加物は含有していません。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- （１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （２）小児の手の届かない所に保管してください。
- （３）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （４）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂      お客様相談室  
電 話      03-3843-3833  
受付時間      9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7