第②類医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

深（しん）　量（りょう）

（ 生 薬 製 剤 ）

◆「深量」は蕁麻疹を改善するために、10 種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使 用 上 の 注 意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
（4）胃腸が弱く下痢しやすい人。
（5）発汗傾向の著しい人。
（6）高齢者。
（7）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
（8）次の症状のある人。　排尿困難
（9）次の診断を受けた人。　高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
（10）次の医薬品を服用している人。　便秘薬（下剤）

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3．服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

軟便、下痢

4．1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

蕁麻疹

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年　　齢	1 回 量	1日服用回数
成　　人	1 包	3 回
7 歳以上 15 歳以下	成人の 1/2 量	
4 歳以上　7 歳未満	成人の1/3 量	
4 歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後２～3 時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品３包（6g）中、下記生薬を含有します。

ケ　イ　ヒ　末	------ 0.6g	カ ン ゾ ウ 末	------ 0.6g
ショウキョウ末	------ 0.6g	ダ イ オ ウ 末	------ 0.6g
シ ャ ク ヤ ク 末	------ 0.6g	マ　オ　ウ　末	------ 0.6g
カ ッ コ ン 末	------ 0.6g	チ　ン　ピ　末	------ 0.6g
オ　ウ　ヒ　末	------ 0.6g	ト　シ　シ　末	------ 0.6g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

（１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（２）小児の手の届かない所に保管してください。
（３）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
（４）１包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、２日以内に使用してください。
（５）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社　建林松鶴堂　　お客様相談室
電　　話　０３－３８４３－３８３３
受付時間　９時から１７時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元　たてばやししょうかくどう
株式会社 建林松鶴堂
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園３-７

2504AM