

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

べん せん とう 便 疝 湯

（生薬製剤）

- ◆「便疝湯」は疝気、筋肉痙攣、便秘、腹痛を改善するために、12種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

疝気^{※)}、筋肉痙攣、便秘、腹痛

^{せん き}
※)「疝気」とは、大腸、小腸、生殖器など下腹部内臓の痛む病気のことを示します。

用法・用量

本品 1 袋を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水 50mL（約 3 合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 日分の 1/3 量	3 回
7 歳以上 15 歳以下	成人の 1/2 量	
4 歳以上 7 歳未満	成人の 1/3 量	
2 歳以上 4 歳未満	成人の 1/6 量	
2 歳未満	成人の 1/10 量	

食間とは…
食後 2～3 時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （１）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （２）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- （３）1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 包（23g）中、下記生薬を含有します。

ショウキョウ	----- 2.0g	センキュウ	----- 2.0g	シュクシャ	----- 2.0g
モッコウ	----- 2.0g	ケイヒ	----- 1.0g	シンコウ	----- 2.0g
シソシ	----- 2.0g	ダイフクヒ	----- 2.0g	モツカ	----- 2.0g
キョウカツ	----- 2.0g	チンピ	----- 2.0g	セイヒ	----- 2.0g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （２）小児の手の届かない所に保管してください。
- （３）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （４）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7