

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

せい ふう とう 清 風 湯

（生薬製剤）

◆「清風湯」は脳溢血、動脈硬化、血圧降下に14種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
生後3カ月未満の乳児。
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
 - (10) 次の医薬品を服用している人。 便秘薬（下剤）
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
| そ の 他 | 発汗過多、全身脱力感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

脳溢血、動脈硬化、血圧降下

用法・用量

本品1袋を煎じる容器（鉄製のものを使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|----------|--------|
| 成人 | 1日分の1/3量 | 3回 |
| 7歳以上15歳以下 | 成人の1/2量 | |
| 4歳以上7歳未満 | 成人の1/3量 | |
| 2歳以上4歳未満 | 成人の1/6量 | |
| 2歳未満 | 成人の1/10量 | |

食間とは…
食後2～3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- （3）1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品1包（34g）中、下記生薬を含有します。

| | | | | | |
|--------|-------|------|-------|-------|------|
| キキョウ | ----- | 3.0g | ニンジン | ----- | 3.0g |
| マオウ | ----- | 3.0g | ソウジュツ | ----- | 3.0g |
| センキュウ | ----- | 3.0g | キシツ | ----- | 3.0g |
| ダイオウ | ----- | 1.0g | カンゾウ | ----- | 1.0g |
| ショウキョウ | ----- | 1.0g | タイソウ | ----- | 1.0g |
| ビャクシ | ----- | 3.0g | チンピ | ----- | 3.0g |
| ウヤク | ----- | 3.0g | ソクダン | ----- | 3.0g |

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7