


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

じゆん せい とう
順 成 湯

（生薬製剤）

- ◆「順成湯」は多汗症、遺尿症を改善するために、13種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。
- （4）高齢者。
- （5）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- （6）次の症状のある人。 むくみ
- （7）次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

多汗症、遺尿症^{※)}

※)「遺尿症^{いによう}」とは、生理的理由なく尿の漏れる症状を示します。

用法・用量

本品 1 包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水 5 5 0 mL（約 3 合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 日分の 1 / 3 量	3 回
7 歳以上 15 歳以下	成人の 1 / 2 量	
7 歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後 2～3 時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （１）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （２）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1 包（24.2g）中、下記生薬を含有します。

ブクリョウ	-----	2.0g	ニンジン	-----	2.0g
シャクヤク	-----	2.0g	カンゾウ	-----	2.0g
ソウジュツ	-----	2.0g	オウギ	-----	2.0g
ボレイ	-----	2.0g	タイソウ	-----	0.2g
シオウ	-----	2.0g	サンソウニン	-----	2.0g
チンピ	-----	2.0g	ビャクシ	-----	2.0g
ウバイ	-----	2.0g			

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （２）小児の手の届かない所に保管してください。
- （３）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （４）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7