

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# ち すい とう 治 水 湯

（生薬製剤）

- ◆「治水湯」は産前産後の水腫、浮腫、ネフローゼ、衰弱せる者の全身浮腫を改善するために、15種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

#### 次の人は服用しないこと

生後3カ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - （1）医師の治療を受けている人。
  - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - （3）胃腸の弱い人。
  - （4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感
3. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

産前産後の水腫、浮腫、ネフローゼ、衰弱せる者の全身浮腫

## 用法・用量

本品 1 包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水 550mL（約 3 合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

年齢	1 回 量	1 日服用回数
成人	1 日分の 1/3 量	3 回
7 歳以上 15 歳以下	成人の 1/2 量	
4 歳以上 7 歳未満	成人の 1/3 量	
2 歳以上 4 歳未満	成人の 1/6 量	
2 歳未満	成人の 1/10 量	

食間とは…  
食後 2～3 時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- （3）1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

## 成分・分量

本品 1 包（22.5g）中、下記生薬を含有します。

ニンジン	----- 1.5g	ソウジュツ	----- 1.5g	オウレン	----- 1.5g
シャクヤク	----- 1.5g	ブクリョウ	----- 1.5g	バクモンドウ	----- 1.5g
トウキ	----- 1.5g	キシツ	----- 1.5g	モクツウ	----- 1.5g
オウゴン	----- 1.5g	コウボク	----- 1.5g	ショウマ	----- 1.5g
センキュウ	----- 1.5g	モッコウ	----- 1.5g	チンピ	----- 1.5g

添加物は含有していません。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室  
電話 03-3843-3833  
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7