

オンジエキス細粒M

⚠️ • 使用上の注意 •

* してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

- (1) 次の診断を受けた人
認知症
- (2) 認知症の疑いのある人



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
* 精神神経系	めまい

*3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

*5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

中年期以降の物忘れの改善

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

用法・用量を厳守してください。

●成分・分量●

1日量(1.2g×3包)中

(オンジ3g)

上記より製したオンジエキス1.1gを含有する細粒剤です。添加物としてヒプロメロース、軽質無水ケイ酸、乳糖、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21