

御使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

第2類医薬品

生薬製剤

れいぎょうげどくがん
羚翹解毒丸®

八ッ目製薬株式会社

本剤は、中国清代に著された《温病条弁》に記載されている「銀翹散」の処方に基づくものです。本剤は有効成分として10種類の生薬を配合し、かぜによるのどの痛み、口(のど)の渴き、せき、頭痛に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
短期間の服用にとどめ、連用しないで下さい。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 胃腸の弱い人
 - 高齢者
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
むくみ
 - 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

- 5～6日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

かぜによるのどの痛み・口(のど)の渴き・せき・頭痛

【用法・用量】

次の量を1日3回食間に水又は白湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	8丸	3回
7歳以上15歳未満	4丸	
5歳以上7歳未満	2丸	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分】

大人（15歳以上）1日の服用量24丸中に、下記成分及び分量より得た水製エキス末3.00gを含んでいます。

成 分	含有量	成 分	含有量
レンギョウ	4.260g	キンギンカ	4.260g
カンゾウ	2.556g	ゴボウシ	2.136g
キキョウ	2.556g	タントウシ	2.136g
ハツカ	2.556g	タンチクヨウ	1.704g
ケイガイ	1.704g	レイヨウカク	0.132g

添加物として、トウモロコシデンプン、タルク、カルナウバロウを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- （2）小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

八ッ目製薬株式会社（お客様相談室）

電 話 （03）3680-0005

受付時間 9:00～17:00（土・日、祝日を除く）

製造販売元

八ッ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14（〒134-0091）