

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第②類医薬品

イ ス ク ラ ま きょう し がい か りゅう

# イスクラ麻杏止咳顆粒S

(生薬製剤)

## ■特徴

「イスクラ麻杏止咳顆粒S」は、麻杏甘石湯にキキョウ、タルク、チンピを加えた処方で植物・鉱物など7種類の生薬が配合されています。これらの原料を製剤化したもので気管支炎、気管支喘息の改善を目的としております。

## ⚠ 使用上の注意

### ■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）で軟便下痢になりやすい人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※裏面もお読みください。

## ■効能・効果

気管支炎、気管支喘息

## ■用法・用量

次の量を、1日3回、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満	服用しないでください。	

### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児には服用させないでください。

## ■成分・分量

本品1日量3包(7.5g)中、下記成分及び分量の生薬より製した麻杏止咳軟エキスS12.5gを含有します。

キキョウ	6.6g
キョウニン	4.5g
カンゾウ	3.6g
セッコウ	3.6g
チンピ	3.6g
タルク	3.3g
マオウ	1.5g

※添加物としてデキストリンを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2  
電 話：03-3281-3363  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで  
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋1-14-2

URL: <http://www.iskra.co.jp/>